


Campanha de conscientização das Imunodeficiências Primárias

10 Sinais de alerta para a Imunodeficiência Primária - IDP



1
Quatro ou mais otites no último ano



2
Duas ou mais infecções de seios paranasais (sinusite) graves em um ano. Asma grave, doença auto-imune



3
Abscessos em órgãos ou abscessos cutâneos profundos recorrentes.



4
Duas ou mais pneumonias no último ano.




5
Dificuldade para a criança ganhar peso e crescer.



6
Evento adverso ao BCG e/ou infecção por micobactéria.



7
Aftas persistentes na boca, infecções micóticas na mucosa ou pele (monilíase/ candidíase).



8
Necessidade de receber antibióticos endovenosos para eliminar infecções.



9
Dois episódios de infecção sistêmica grave, por exemplo: septicemia, meningite e osteoartrite.



10
Antecedentes familiares de imunodeficiência primária.

Na presença de um ou mais destes sinais fique atento quanto à possibilidade de IDP, investigue!

História familiar de IDP ou problemas após a vacina BCG, assegure-se antes de vacinar - Programa BCG seguro.

Disciplina de Imunologia e alergia do Departamento de Pediatria - FCM.
Ambulatório de Imunodeficiências Primárias 32063

Departamento de Enfermagem, SEAMPE e Enfermagem do Ambulatório de Pediatria
Hospital de Clínicas - UNICAMP

Referência: Adaptado texto e figuras da Fundação Jeffrey Modell - <http://www.info4pi.org>